





# Asulox<sup>®</sup>

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i spinatkulturer til frø, avlet på kontrakt.

Skal opbevares frostfrit

## BRUGSANVISNING

### Anvendelsesområde

Asulox bekæmper bredbladet ukrudt i spinat.

### Afgrøder

Asulox må kun anvendes i spinatfrø, dyrket på kontrakt.

### Virkemåde

Asulox er et systemisk ukrudtsmiddel, som hovedsageligt optages gennem bladene, men også i nogen grad gennem rødderne.

### Anvendelse og dosering

Asulox må kun anvendes i spinatfrø avlet på kontrakt til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt med 2,0 ltr. pr. ha. Miljøstyrelsen vurderer, at brug af Asulox indebærer en risiko for grundvandet, og midlet må derfor kun bruges, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt.

Asulox er omfattet af dispensation fra Miljøministeriet.

### Sprøjetidspunkt

Asulox udsprøjtes, når spinaten har min. 2 blivende blade. Ukrudt med mere end 4 løvblade kan ikke forventes bekæmpet tilfredsstillende.

### Udsprøjtning

Asulox udsprøjtes med båndsprøjteudstyr der giver et sprøjtebånd på 20 cm, og der anvendes en rækkeafstand på 50 cm. For at sikre den bedste fordeling i sprøjtebåndet anbefales en "even spray" dyse eks. Hardi 4680 E. Båndsprøjtning er fra år 2002 et krav. Af hensyn til opnåelse af den bedst mulige effekt, frarådes det at foretage båndsprøjtning i forbindelse med radrensning, da støv på bladene vil kunne give anledning til effekttab.

### Tilberedning af sprøjtevæsken

Tanken fyldes halvt op med rent vand, og omrøringen startes. Asulox hældes i tanken, som efterfyldes med vand. Sørg hele tiden for god omrøring.

Ved omgang med sprøjtemidler, bør altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.

### Klimaets indflydelse

Asulox er effektivt, når temperaturen er 8-10°C eller derover. Lunt og fugtigt vejr fremmer planternes vækst og vil virke gunstigt på optagelse og transport i planten og hermed øge effektsikkerheden.

### Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

### Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.

**SERVICETELEFON 70 27 81 27**

Medlem af

**Dansk  
Planteværn**

Bayer A/S  
Bayer CropScience  
Nørgaardsvej 32  
2800 Kgs. Lyngby  
Tlf. 45 23 50 00  
[www.bayercropscience.dk](http://www.bayercropscience.dk)



**Bayer CropScience**