

Brugsanvisning

Ethofol 500 SC anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer. Ethofol 500 SC har både blad- og jordvirkning. Midlet virker vækststandsende på ukrudtet. Sammen med Betasana 2000 og Metafol 700 SC opnås en særdeles bred og effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Ethofol 500 SC anvendes efter roernes fremspiring. Midlet har god effekt på "agerkål", burre-snerre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, pileurter, storkenæb, spergel, tvetand og æren-pris. Effekten på kamille, liden nælde og sort natskygge er begrænset, og rodukrudt som f.eks. kvik og tidsel bekæmpes ikke.

Forslag til renholdessystemer med Ethofol 500 SC - liter pr. ha:

Såfremt der sprøjtes meget tidligt i ukrudtets udvikling, og der er gode sprøjtebetingelser, kan de højeste doseringer af Betasana 2000 reduceres lidt.

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende	
1. sprøjtning første ukrudt på kimbladstadiet	1,4 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie
2. sprøjtning 6-8 dage efter 1. sprøjtning	1,4 liter Betasana 2000 + 0,14 liter Ethofol 500 SC + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie
3. sprøjtning 1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved nyfremspiring	1,4 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde

- korsblomstret ukrudt, pileurt, burre-snerre, storkenæb evt. hundepersille

1. sprøjtning første ukrudt på kimbladstadiet	1,5-2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie
2. sprøjtning 6-8 dage efter 1. sprøjtning	2,0 liter Betasana 2000 + 0,14 liter Ethofol 500 SC + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie
3. sprøjtning 1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved nyfremspiring	2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie

NB: Betasana 2000-indhold: 160 g phenmedipham/liter.

Metafol 700 SC-indhold: 700 g metatrimon/liter.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hver 3. år.

Ved forekomst af hundepersille tilsættes 15-20 g Safari til 2. og 3. sprøjtning.

Olietilsætning

Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C	0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha
15-20°C	0,2-0,5 liter penetreringsolie pr. ha
20-25°C	0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha
Over 25°C	undlades normalt olietilsætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen tilsætning af 0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik

Ved bredsprøjtning anbefales en vandmængde på ca. 200 liter vand pr. ha. Dysevalg f.eks.: Hardi 4210-14, ISO-F-02-110 eller LD-025-110. Ved udsprøjtning sammen med Metafol 700 SC. Se Metafol-etiket.

Fremstilling af sprøjtbevæsk: Sprøjtbeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter Metafol 700 SC tilsættes gennem sien. Husk omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fordelt tilsættes Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Vejrforhold: Ethofol 500 SC og tankblandinger hvori midlet indgår, virker bedst på saftspændte, men tørre planter under gode vækstforhold.

Tankblandinger med SweDane Betasana 2000 udsprøjtes under kellige vejrforhold først på dagen. I perioder med varmt og solrigt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt af lave nattemperaturer, evt. nattefrost, frarådes sprøjtning.

Afstand til andre behandlinger: Det anbefales, at der er en uges afstand til andre sprøjtninger. Evt. kvikbekæmpelse med Fusilade X-tra eller Agil bør først udføres, når kvikken er fri for eventuelle svidninger efter sprøjtning med Ethofol SC.

Omsåning: Ved anvendelse i et sprøjtprogram med Metafol 700 SC - se Metafol-etiketten.

Renngøring af sprøjtet: Straks efter arbejdets afslutning bør sprøjtet rengøres. Skyl tanken grundigt med rent vand. Sprøjt skyllevandet ud på den behandlede afgrøde. Fyld sprøjtet med vand og tilsæt rensmiddel - f.eks. All Clear Extra. Start pumpen og lad den køre i 5-10 minutter. Aktiver alle ventiler, så filtre, slanger og dysser kommer i kontakt med rensmidlet. Efterfyld med vand, og lad rensmidlet virke i 15-20 minutter.

Tøm sprøjtet gennem bom og dysser på et egnede areal - fjern bunddroppen så tanken tømmes helt. Sprøjtet fyldes igen med vand tilsat rensmiddel. Pumpen startes så alle dele i sprøjtet kommer i berøring med rensopløsningen. Lad opløsningen stå i 15-20 minutter, hvorefter den udsprøjtes over et egnede areal.

Ved montering af roterende spuleudfyld kan vandmængden reduceres til 10-15% af tankens rumindhold.

Bemærk: Blandinger med Ethofol 500 SC, Betasana 2000 og Metafol 700 SC er normalt skånsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende vejr- og vækstforhold kan der opstå forbigående vækstdepressioner.

Blandinger: Udover de i sprøjtplanerne nævnte blandinger kan Ethofol 500 SC blandes med Cypemetrin og Pirimor G. Det frarådes at blande med SweDane Dimethoat 40 eller evt. andre midler der kan indeholde organiske opløsningsmidler.

Rester og tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæsk.

Opbevaring: Frostfrit.

Ethofol 500 SC

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Deklaration:

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel: 14-178

Aktivstof: 500 g/l ethofumesate (44,3%)

Indhold: 1 liter

Type: Flydende

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjtudyret nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig

Førstehjælp

Indånding: Intet specielt. Sørg for frisk luft.

Indtagelse: Søg straks læge.

Hud: Forurenede hud vaskes med vand og sæbe.

Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 10 minutter. Søg læge.

Omrystes før brug.

Fabrikationsnr.:

AgroDan